

## 【アタマジラミが発生しています】



### 1. アタマジラミの見つけ方

#### ①かゆみがある

アタマジラミに吸血されるとかゆみが生じます。子どもが頭をかくようなしぐさを繰り返すようであれば要注意です。ただし、寄生の初期や数が少ない時はかゆくない場合もあります。

#### ②髪の毛に卵がついている

成虫や幼虫は動き回るので、寄生数が少ないと見つけにくい。成虫を見つけるより卵を探すことで寄生したかがわかります。卵は耳の後ろや後頭部（えりあし）にかけて多く付着しています。



### 2. アタマジラミが疑われたら・・・

#### ①登園について

皮膚科の受診し、医師の診断を受けて下さい。アタマジラミと診断されても駆除を開始していれば（スミスリンシャンプーの使用）登園は可能です。駆除方法は下記をご参照ください。

#### ②帽子・衣類・シーツ類等について

◆帽子、着替えた衣類、シーツ類はビニール袋に密閉し返却しますので、家庭で熱処理（60℃を保ったお湯に5分以上つける、もしくはアイロン）を行って下さい（持ち帰り用の大きめのビニールをお持ちください）。※衣類やシーツ類のお持ち帰りは、卵が完全になくなって3日経過するまで続きます。

### 3. 駆除方法

#### スミスリンシャンプーと専用グシによる駆除

①頭髪を濡らし、スミスリンシャンプーを髪の生え際、耳の後ろ側、襟元まで薬が十分にいきわたるようにシャンプーします。

②シャンプー後5分間は洗い流さず、5分経過したら髪を十分にすすぎます。


③リンスと専用グシを使って卵を除去しましょう。

リンスしながら髪を一方方向（後方が良い）にシャワーブラシなどで丁寧にブラッシングします。髪が長い子などは特に念入りに行います。髪を1～3cm位に小分けしながら専用グシで髪の根元から梳きとります。専用グシを光にかざして、根元などに卵などが挟まっている場合は、歯ブラシでそぎ落とします。

④髪をすすいで、ドライヤーで乾かして終了。

⑤その後卵の残り具合を点検します。

以上を1日1回3日間隔で3～4回行って下さい。



スミスリンシャンプーを使用しない日も、大人が洗髪、ブラッシングを行い、ドライヤーで乾かし、頭髪の観察を行って下さい。

### 4. 注意

- ・卵は薬に強いので駆除できません。また、抜け殻もとらないと駆除が終了したかどうかわかりにくいので、クシなどで物理的にとりましょう（大人の爪でしごきとる方法が確実に取れます）。
- ・使ったブラシなどに卵が付着していることがあるので、60℃を保ったお湯で5分間浸けるか熱風のドライヤーをかけましょう。
- ・駆除が終わってもしばらくは卵が残っていないか頭髪を観察して下さい。